

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

## ÉDITION DE LA STATION "BRETAGNE"

(COTES-DU-NORD, FINISTÈRE, ILLE-ET-VILAINE, MORBIHAN)

### SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

280, rue de Fougères, 35000 RENNES — Tél. (99) 36-01-74

60 F

ABONNEMENT ANNUEL 1/50 F

Sous-Régisseur de recettes de la D. D. A.

PROTECTION DES VÉGÉTAUX

C. C. P. RENNES 9404-94

Bulletin n° 86

20 juillet 1978

#### GRANDES CULTURES

##### MILDIOU DE LA POMME DE TERRE

Des taches étant présentes dans de nombreux secteurs, la maladie risque de se développer rapidement à l'occasion de prochaines pluies.

Lorsque le défanage n'est pas prévu d'ici peu, intervenir à nouveau dès que possible sur les variétés sensibles au mildiou.

Ajouter un insecticide en présence de doryphores.

#### CULTURES LEGUMIERES DE PLEIN CHAMP

##### MOUCHE DU CHOU

Des dégâts de mouche du chou sont signalés. Pour limiter les attaques il est conseillé, avant le repiquage, de tremper les plants, pendant 10 minutes, dans une bouillie à base de l'un des produits suivants :

- Chlorfenvinphos (Birlane, Psilatox) : 10 g de MA pour 10 litres d'eau
- Trichloronate (Phytosol) : 10 g de MA pour 10 litres d'eau

##### PUCERONS CENDRES ET CHENILLES SUR CHOUX

Des attaques de pucerons cendrés et de chenilles de la teigne des crucifères sont à craindre actuellement.

Examiner régulièrement les cultures. Si ces ravageurs apparaissent, effectuer un traitement à base de Malathion, de Parathion ou de Phosalone, efficaces à la fois contre pucerons et chenilles.

#### CULTURES FRUITIERES

##### TAVELURES DU POMMIER ET DU POIRIER

Dans les vergers où des taches de tavelure ont été constatées, un nouveau traitement pourra être entrepris lorsque 25 mm de pluie seront tombés depuis la précédente application.

P.1.135

## CARPOCAPSE DES POMMES ET DES POIRES

Le relèvement des températures de ces jours derniers a favorisé les pontes dans les situations les plus chaudes. Une application est préconisée, à l'éclosion des oeufs vers le 25 juillet, seulement dans les vergers situés dans la moitié Sud de la Bretagne.

Le Chef de la Circonscription phytosanitaire  
"Bretagne"

G. CHERBLANC